

Ερώτηση:

Καλημέρα σας! Έχω ένα γερμανικό ποιμενικό και έχει εκδηλώσει θήλωμα, το οποίο έχει προχωρήσει και στη μύτη. Τι μπορώ να κάνω για να το αντιμετωπίσω; Ευχαριστώ!

Απάντηση: Θα σας παρακαλέσω να γίνετε περισσότερο σαφής. Ποια είναι η ηλικία του σκύλου; Είναι στερημένος; Ποια είναι η πρώτη εντόπιση; Το μέγεθός του; Πως έχει γίνει η διάγνωση του θηλώματος; Γενικά, τα θηλώματα είναι καλοήθειες νεοπλασίες του δέρματος. Η θεραπεία είναι συνήθως η χειρουργική εξαίρεση.

Απάντηση κυρίου Τάκη:

Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ο σκύλος μου είναι 4 χρονών. Δεν έχει γίνει στείρωση. Είναι αρσενικός και το θήλωμα είχε διαπιστωθεί από άλλον συνάδελφό σας. Στην αρχή είχε εκδηλωθεί λίγο στο χείλος και τώρα, μετά από ένα χρόνο, έχει εξαπλωθεί και στη μύτη. Δεν είναι σε μεγάλο βαθμό αλλά ο σκύλος ενοχλείται από αυτό. Στην αρχή μας είπαν να πάρουμε αντιβίωση από ανθρώπινο φαρμακείο και είχε φύγει. Μετά όμως από ένα χρόνο, δηλαδή τώρα, εμφανίστηκε ξανά. Κάποιοι μας είπαν ότι ο σκύλος χρειάζεται αντιβίωση από κτηνιατρικό φαρμακείο και όχι από ανθρώπινο. Κάποιοι άλλοι μας είπαν ότι θα πρέπει να κάνουμε τεστ για καλαζάρ. Ο σκύλος όμως είναι πολύ ευδιάθετος και τρώει κανονικά. Δεν δείχνει κάποιο σημάδι εκτός από το θέμα της εμφάνισης που έχει με τα θηλώματα. Ευχαριστώ!

Απάντηση: Καλησπέρα. Τα θηλώματα απαντώνται συχνότερα σε νεαρά ζώα (ηλικίας 6 μηνών έως 4 ετών) καθώς και σε ανοσοκατασταλμένα ζώα (π.χ. χρόνια χρήση κορτιζόνης ή κυκλοσπορίνης). Η αιτία των θηλωμάτων είναι ιογενής, δηλαδή, οφείλονται σε ιό του γένους papilloma και εντοπίζονται ή μέσα στο στόμα ή στο δέρμα. Θέλω να επισημάνω ότι πουθενά στη βιβλιογραφία δεν αναφέρεται η χορήγηση αντιβίωσης (κτηνιατρικής ή ανθρώπινης δεν έχει διαφορά) ως θεραπευτική αγωγή για την αντιμετώπιση των θηλωμάτων! Η θεραπεία όπως σας έγραψα και την προηγούμενη φορά είναι η χειρουργική αφαίρεση. Στα περιστατικά που οφείλονται σε ανοσοκαταστολή η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμάκων όπως είναι η ιντερφερόνη ή άλλες ανοσορρυθμιστικές ουσίες. Το συμπέρασμά μου είναι πως μάλλον ο σκύλος σας δεν έχει θήλωμα. Θα σας πρότεινα να πάρετε μια δεύτερη γνώμη και να ξέρετε ότι οριστική διάγνωση γίνεται μετά από βιοψία. Ελπίζω να

Απάντηση κυρίου Τάκη

Συντάχθηκε απο τον/την Αρβανίτης Γεώργιος

Σάββατο, 03 Νοέμβριος 2012 12:09 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:46

βοήθησα. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες είμαι στη διάθεσή σας!

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

Καλημέρα σας κύριε Προκοπίου!

Σας παραθέτουμε δύο ερωτήσεις που απηύθυναν προς εσάς μέλη της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας.

Η μεν πρώτη είναι από τον κύριο Σωτήρη.

«Γεια σας! Έχω ένα κουτάβι 2,5 μηνών και το Σάββατο κάπου χώθηκε και σφήνωσε..δεν ξέρω για πόση ώρα, στη μέση του. Αποτέλεσμα ήταν να πρηστεί το πίσω δεξί πόδι του. Αργά το βράδυ είχε ξεπρηστεί. Ακόμα και σήμερα δεν το πατάει καλά και πιο πολύ το πέλμα του, το στραβοπατάει. Λέτε το πρόβλημα στο κουτάβι να παραμείνει; Σε πόσο διάστημα θα επανέλθει; Σας ευχαριστώ!»

Και η δεύτερη από τον κύριο Θοδωρή.

«Το σκυλί πρέπει να είναι νηστικό ή φαγωμένο όταν του κάνουμε εμβόλια;»

Μπορείτε να μας στείλετε τις απαντήσεις σας στον ίδιο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως απαντητικό μήνυμα και θα αναλάβουμε εμείς την ανάρτησή τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.lovemypet.gr ώστε να είναι δυνατή και η δημοσίευση των απαντήσεών

Απάντηση κυρίου Τάκη

Συντάχθηκε απο τον/την Αρβανίτης Γεώργιος

Σάββατο, 03 Νοέμβριος 2012 12:09 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 26 Νοέμβριος 2012 09:46

σας ως αρθρογράφος.

Παρακαλούμε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο <http://www.lovemypet.gr/component/comprofiler/registers> για να εγγραφείτε.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Για τη LOVEMYPET,

Το τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης.