

Ερώτηση:

Καλησπέρα σας! Πριν ένα μήνα έκανα στον 2 ετών γάτο μου το αντιλυσικό. Περίπου μιάμιση εβδομάδα μετά έβγαλε ένα οζίδιο στο σημείο της ένεσης σαν μια μπίλια. Κινείται με το δέρμα και δε συνδέεται με μυς ή οστά! Μου είπαν ότι είναι αντίδραση, να παρακολουθήσω αν μεγαλώνει και ότι θα φύγει σε περίπου δύο εβδομάδες. Είναι τώρα τρίτη εβδομάδα που επιμένει. Δεν έχει μεγαλώσει αλλά ούτε έχει μειωθεί αισθητά. Είναι κάποια χιλιοστά μικρότερο αλλά ακόμα εκεί!! Οι αιματολογικές του είναι καθαρές αλλά επειδή μου είπαν για χειρουργική αφαίρεση αν δεν απορροφηθεί σε λίγες μέρες και δεν θέλω ούτε να τον ταλαιπωρήσω άδικα με χειρουργεία αλλά ούτε να ρισκάρω αφήνοντας το να εξελιχθεί σε κάποιο σάρκωμα, θα ήθελα τη συμβουλή σας..πόσο καιρό μπορώ να περιμένω χωρίς να υπάρχει κίνδυνος, πριν αποφασίσω την αφαίρεσή του;; Ευχαριστώ πολύ!!

**Απάντηση:** Κυρία Μάρθα, αυτό που περιγράφετε είναι πολύ συχνό στα γατιά και είναι αντίδραση που συμβαίνει τοπικά από το εμβόλιο και από κάποια άλλα φάρμακα. Αυτή η σκληρή διόγκωση που υπάρχει πολλές φορές υποχωρεί μόνη της σιγά σιγά (υπάρχουν και κάποια φάρμακα που βοηθούν) σε διάστημα 1- 2 μηνών ή και πιο πολύ. Αν δεν υποχωρήσει, τότε είναι καλό να αφαιρεθεί και στο μέλλον να μην του ξαναγίνει ένεση στο ίδιο σημείο. Καλή επιτυχία!