

Ερώτηση:

Καλησπέρα!! Έχω απορίες σχετικά με το θέμα του θηλασμού των κουταβιών. Διάβασα στο internet ότι πρέπει να θηλάζουν μέχρι την ηλικία των 7-8 εβδομάδων από τη γέννησή τους, ισχύει αυτό;; Αν όμως για παράδειγμα θηλάσουν λιγότερο, δηλαδή 5-6 εβδομάδες, θα υπάρξουν αργότερα προβλήματα στην υγεία τους και στο ανοσοποιητικό τους σύστημα;; Μετά την απομάκρυνση από τη μητέρα τους επιτρέπεται να δώσουμε σε κουτάβι γάλα σε σκόνη; (ειδικό φυσικά για κουτάβια) Τέλος, πόσες πιθανότητες υπάρχουν ένα κουτάβι να γεννηθεί τυφλό; Μπορεί να διαγνωσθεί κάτι τέτοιο σε μικρή ηλικία από κτηνίατρο;;

Υ.Σ.: Η εσωτερική αποπαρασίτωση γίνεται μαζί με το 1ο εμβόλιο στις 6-8 εβδομάδες περίπου ή πρέπει νωρίτερα;; Πόσο πρέπει να είναι η δόση;; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!

Απάντηση: Κύριε Άκη, ο θηλασμός ποικίλει σε διάρκεια από μητέρα σε μητέρα και από τοκετοομάδα σε τοκετοομάδα. Συνήθως, όταν τα δοντάκια είναι αρκετά μεγάλα, οι θηλές πληγώνονται, πονάνε, και οι σκύλες τα απομακρύνουν. Αυτό συμβαίνει γύρω στους δυο μήνες. Οποσδήποτε δεν θα συμβούλευα να απομακρύνονται τα κουτάβια από τη μαμά τους πριν τον ενάμιση μήνα. Το γάλα σε σκόνη το προτείνω σε κουτάβια κάτω του μηνός όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν θηλάζουν. Μετά προτείνω γάλα πλήρως παστεριωμένο (εβαπορέ) με αναλογία νερού 1/2.5-1/3. Οι πιθανότητες να γεννηθεί κουτάβι τυφλό είναι πολύ μικρές ενώ αντίθετα στις γάτες είναι πολύ μεγαλύτερες. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει την καλή υγεία της σκύλας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (απαραίτητοι οι εμβολιασμοί και οι αποπαρασιτώσεις προ της εγκυμοσύνης) και την αποφυγή διασταύρωσης συγγενικών αιμάτων. Δεν συστήνω εμβόλια προ των 50 ημερών σε κουτάβια τα οποία έχουν πάρει πρωτόγαλα (γάλα φυσικό για τις πρώτες 3-5 μέρες). Το πρωτόγαλα είναι η φυσική μεταφορά ανοσίας από τη μάνα στα κουτάβια. Επομένως, όσο πιο "up to date" ανοσολογικά είναι η μαμά... τόσο πιο καλό οπλοστάσιο έχουν τα κουτάβια. Μάλιστα εάν τα κουτάβια είναι μικρόσωμων φυλών καλό είναι να προστατεύονται από εξωτερικούς παράγοντες και να εμβολιάζονται κοντά στις 60 μέρες - μέχρι να αποκτήσουν δύναμη και σωματική μάζα ικανή να ανταπεξέλθει το stress του εμβολίου. Η πρώτη αποπαρασίτωση πρέπει να γίνεται γύρω στο μήνα και καλό είναι να ελέγχονται τα κόπρανα το επόμενο τριήμερο. Αν επιβεβαιωθεί η μόλυνση, καλό είναι να επαναληφθεί μετά το 15νθημερο μέχρι να βεβαιωθούμε ότι καθάρισαν. Η δόση ποικίλει ανάλογα με το φάρμακο και το βάρος του κουταβιού. Μολυσμένα κουτάβια σημαίνει μολυσμένη σκύλα και περιβάλλον χώρος...επομένως πρέπει να αποπαρασιτωθεί και η σκύλα, να μπανιριστούν όλα τα ζώα (προσοχή στο κρύωμα) και να πλυθεί καλά με ζεστό νερό και σαπούνι η φωλιά και τα πέριξ.

Δράττομαι της ευκαιρίας να ξεκαθαρίσω ότι τα αποπαρασιτικά από το στόμα, έχουν άμεση αλλά περιορισμένη χρονικά δράση. Έτσι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως το χάπι του διμήνου, του τριμήνου ή του εξαμήνου που ακούω συνέχεια στο ιατρείο.

Αν το ζώο σας ξαναμολυνθεί μετά από 10 μέρες, θα αποκτήσει πάλι παράσιτα!

Επομένως, θέλει προσοχή στο περιβάλλον που κυκλοφορεί το ζώάκι σας και στο τι βάζει στο στόμα του στη βόλτα. Εμείς σαν γιατροί σταθμίζουμε τους κινδύνους και συστήνουμε αποπαρασίτωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε σχέση πάντα με τον τρόπο διαβίωσης, το περιβάλλον του ζώου σας και τους κινδύνους μετάδοσης στον άνθρωπο. Ελπίζω να απάντησα σε όλες σας τις απορίες...