

Απάντηση Κας Μαρίας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντίνιδης Ιάκωβος

Τετάρτη, 04 Δεκέμβριος 2013 11:41 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2013 14:12

Ερώτηση:

Καλησπέρα έχω ένα πομεράνιαν 1.5 μηνών πήγα και του έκανα το πρώτο εμβόλιο το Vanguard cρν και da2pi. Εχτές το πρωί το βράδυ το σηκώναμε αγκαλιά και δεν ήθελε γρύλιζε και πήρα τον κτηνίατρο και μου είπε να του δώσω deron 0,5. Σήμερα συνεχίζει να μην θέλει να το σηκώνουμε και έκανε και εμετό. Τι μπορώ να κάνω? Είναι φυσιολογικό από το εμβόλιο?

Απάντηση:

Μάλλον κάτι δεν της "έκατσε" καλά από τη νέα τροφή. Επαναφέρετε την παλιά διαίτα -σε light μορφή- και χορηγήστε λίγο αντιεμετικό (1/2 ml Primperan σιρόπι) μία ώρα πριν από κάθε γεύμα για δυο μέρες. Χορηγήστε τροφή αν θωρο σε μικρές δόσεις. Δεν μας ενδιαφέρει να φάει πολύ αλλά να κρατήσει το έστω λίγο φαγητό που θα φάει. Καλή τύχη!