

Απάντηση Κας Βαλεντίνας

Συντάχθηκε απο τον/την Ζερβέας Αλέξανδρος

Δευτέρα, 31 Μάρτιος 2014 11:56 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 02 Απρίλιος 2014 13:54

Ερώτηση:

Γεια σας. Διαγνώστηκε στο σκυλάκι μου ράτσας πάρσον ράσελ 11,3 κιλά και 3 ετών σχεδόν βήχας κυνοκομείου. Πήραμε eradore 1.6ml + augmentin 2.5ml ανά 12ωρο (2 φορές /ημ) για 14 μέρες. Παρόλο που τελείωσαν όλα καλά. Μετά από 2 μέρες άρχισε φτέρνισμα και λίγος βήχας! Τι να κάνω άλλο? Να συνεχίσω αντιβίωση? Δεν γίνεται πλήρως καλά απ' ότι βλέπω το σκυλάκι μου. Τι με συμβουλεύετε? Σκέφτηκα τις σταγόνες για το βήχα αλλά δεν ξέρω καν πως λέγεται το σκεύασμα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση:

Χαίρετε κυρία Βαλεντίνα. Σύμφωνα με όσα γράφετε το πρόβλημα υγείας του σκύλου σας θα έπρεπε να αποτελούσε παρελθόν. Αν συνεχισθεί ο βήχας σας προτείνω να επισκεφθείτε τον κτηνίατρο σας και να ζητήσετε να γίνουν επιπλέον εξετάσεις. Ίσως η αρχική διάγνωση να μην είναι σωστή. Επ' ουδενί λόγω μην συνεχίσετε την χορήγηση της αντιβίωσης άνευ σχετικής αδείας του κτηνιάτρου που παρακολουθεί το σκυλάκι σας.