

Ερώτηση:

Γιατρέ καλησπέρα, το γατάκι μου έκανε μια αγωγή με αμοξίλ 250 3μλ ανά 12ωρο για 40 ημερες. Είναι 3μηνών βάρος 800-1000gr. Η αγωγή σταμάτησε λόγω μεγάλης διάρκειας με αποτελεσματικότητα 90%. 2 εβδομάδες μετά υποτροπίασε -μάτια φτέρνισμα- εδώ και 2 ημέρες δεν τρώει δε πίνει, αλλά έχει κέφι-των ταΐζω με συριγγα. Τι αγωγή συστήνετε; Ευχαριστώ.

Απάντηση:

Κύριε Νίκο, με κάθε επιφύλαξη (δεν έχω εξετάσει το γατάκι σας) δίνετε "λάθος" αντιβίωση...για επικίνδυνα πολύ διάστημα. Αν μιλάμε για ρινοτραχείτιδα τότε η ενδεικνυόμενη αγωγή είναι Vibramycin 10mgr ημερησίως X 14 μέρες αρχικά μαζί με 1 mgr / μέρα κορτιζόνη (την 1η εβδομάδα)και κατόπιν με 0.5 mgr / μέρα κορτιζόνη (την 2η εβδομάδα). Δεν μπορείτε να συνεχίσετε πέραν των δυο εβδομάδων... απαιτείται να ξεκουράσετε τον οργανισμό του για άλλες δυο εβδομάδες! Πολλές φορές αυτές οι ιώσεις καταστρέφουν τον ρινικό βλεννογόνο και ευαισθητοποιούν έτσι το ζώο σε νέες μολύνσεις που τα ταλαιπωρούν εφόρου ζωής. Εναλλάξ μπορείτε να αλλάζετε το Vibramycin με Baytril...και καλή τύχη!

Απάντηση Κου Νίκου

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Πέμπτη, 28 Ιανουάριος 2016 15:30 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 29 Ιανουάριος 2016 14:30

Κωνσταντάρας Γιάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ