

Απάντηση κας Μαρίας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2016 11:48 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 22 Μάρτιος 2016 10:52

Ερώτηση:

Καλημέρα σας ,

Ο λόγος που επικοινωνώ μαζί σας είναι γιατί ο γάτος μου που είναι 13 χρόνων προχθές το βράδυ έκανε 2 φορές εμετό κ μετά ούρλιαζε κ έπεσε στο πάτωμα με τη γλώσσα έξω. Τον πήγαμε στην κτηνίατρο κ την επόμενη κάναμε εξετάσεις όπου φάνηκε ότι οι τιμές τις γλυκόζης (glu) είναι αρκετά υψηλές στο 38 κ διεγνώσθη με ζάχαρο- διαβήτη. Επί 2 εβδομάδες πριν αυτό το περιστατικό, έπινε ακατάπαυστα νερό κ ουρούσε 10 φορές την ημέρα σίγουρα αλλά λόγω του ότι συμπτωματικά είχαμε αλλάξει την τροφή του εκείνο το διάστημα (την urinary stress πήραμε) το αποδώσαμε εκεί. Η κτηνίατρος μας είπε από εδώ κ πέρα θα κάνουμε ανά δωδεκάωρο ενέσεις ινσουλίνης κ θα τρώει ο γάτος αμέσως μετά την ένεση την τροφή w/d δυο φορές την ημέρα μόνο. Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο χάπι αντί για τις ενέσεις κ αν μπορώ να τον ταΐζω λίγο πιο συχνά γιατί είχε συνηθίσει να τρώει πολλές φορές από λίγο κ φοβάμαι ότι όλες αυτές οι αλλαγές μην τον ρίξουν πολύ. Επίσης είμαι έγκυος στον ένατο μήνα από μέρα σε μέρα περιμένω να γεννήσω κ όλη αυτή η κατάσταση με έχει ρίξει πάρα πολύ ψυχολογικά, δεν ξέρω τι να κάνω για να συνηθίσω αυτή τη νέα πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων κ περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας.

Μαρία

Απάντηση:

Καταρχάς μην στρεσάρεστε και καλή λευτεριά!

Το ζώο σας είναι διαβητικό και πρέπει να έχετε ΑΠΟΛΥΤΗ συνεργασία με τον γιατρό σας για να δείτε αποτέλεσμα. Όχι δεν υπάρχει χάπι. Υπάρχουν ειδικές διαβητικές τροφές

Απάντηση κας Μαρίας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2016 11:48 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 22 Μάρτιος 2016 10:52

γάτας (πχ Royal Canin Diabetic cat). Υπάρχει περίπτωση (μου έχει συμβεί συχνά) με μια τάξη στο φαγητό και με κατάλληλη ειδική διαίτα να ελέγχεται το επίπεδο της γλυκόζης και να μη χρειάζεται να κάνετε ενέσεις...όχι αμέσως όμως! Αυτό, μόνο μετά από συνεχείς ελέγχους γλυκόζης και σε συνεργασία με τον γιατρό σας. Ο αριθμός και η ποσότητα και ο χρόνος των γευμάτων πρέπει να είναι σταθερός και σε συνάρτηση με την χορήγηση ινσουλίνης. Εύχομαι να πάτε καλά και γρήγορα να έχετε ένα-δυο άγχη λιγότερα!

Κωνσταντάρας Γιάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ