

Απάντηση κας Ζάνας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Τετάρτη, 09 Νοέμβριος 2016 14:23 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2016 11:02

Ερώτηση:

Καλησπέρα, έχω ένα labrador 5 χρονών, θηλυκό, στερωμένο με κανένα πρόβλημα υγείας μέχρι στιγμής. Εδώ και 10 μέρες κάνει περιστασιακά εμετό (όχι κάθε μέρα αλλά μέρα παρά μέρα κάποιες φορές) κάθε φορά όταν ξυπνήσει πριν φάει κίτρινου χρώματος!! Κάναμε εξετάσεις αίματος και ελέγχθηκε και η ουρία, βγήκαν όλα καλά εκτός από τον αιματοκρίτη που ήταν λίγο υψηλός. Άλλο σύμπτωμα δεν έχει.. Την ανάγκη της την κάνει κανονικά και ούτε έχει πυρετό. Τρώει κανονικά, ξηρά τροφή (royal canin) εδώ και χρόνια μαζί με λίγη κονσέρβα 2 φορές τη μέρα. Τι μπορεί να έχει?? Ευχαριστώ πολύ!!!

Απάντηση:

Κα Ζάνα,

καταλαβαίνετε ότι η απάντηση θα μπορούσε να περιλαμβάνεται σε δεκάδες σελίδες μια που υπάρχουν διάφορα νοσήματα που εκδηλώνονται ΚΑΙ με εμετό. Αν απλοποιήσουμε όμως τα πράγματα και παίρνοντας υπόψη τις αρνητικές σας εξετάσεις καταλήγουμε συνήθως σε λίγο πολύ ίδιες απαντήσεις. 1)Κάνετε καλή αντιπαρασιτική αγωγή για τα ενδοπαράσιτα; Εξασφαλίστε το με δυο δόσεις ανά 7ημερο. 2)Υπάρχει περίπτωση το ζώο σας να έχει καταναλώσει κόκκαλα τελευταία ή να έχει καταπιεί ξένο αντικείμενο; Τα κόπρανα του έχουν σωστό χρώμα και σύσταση; Σε τέτοια προβλήματα ίσως ένας υπέρηχος να έδινε απάντηση. 3)Το πιο κοινό είναι η γαστρίτιδα συνήθως με αδιευκρίνιστη αιτιολογία...έχει να κάνει με την τροφή, τον τρόπο που δουλεύει το πεπτικό του ζώου σας και την ποσότητα γαστρικών υγρών που εκκρίνει το στομάχι του και κατά τη διάρκεια της πέψης αλλά και κατά τη διάρκεια που το στομάχι του είναι άδειο. Σε αυτή την περίπτωση (και εφόσον οι εμετοί γίνονται πάντα με άδειο στομάχι) συστήνουμε χορήγηση για αρκετό καιρό αντιεμετικών και αντιόξινων δυο με τρεις φορές την ημέρα. Δεν μπορώ να αναφερθώ στα εμπορικά σκευάσματα αλλά μια κοινή θεραπεία είναι με μετοκλοπραμίδη (0.4 mgr/ Kg) ως αντιεμετικό μια ώρα προ του γεύματος και με ρανιτιδίνη (2mgr/Kg) ως αντιόξινο μια ώρα μετά το γεύμα. Τρία μικρά γεύματα την ημέρα και θεραπεία για 7-10 μέρες και με τα δυο, και μετά άλλες 20 μέρες μόνο με ρανιτιδίνη. Υπάρχουν και ιδιαίτερες τροφές στο εμπόριο για ευαίσθητα στομάχια και ίσως να άξιζε να τις δοκιμάσετε ώστε να μείνει το στομάχι του ζώου σας σε καλή κατάσταση χωρίς να χρειάζεται να δίνετε συνεχώς φάρμακα. Εννοείται ότι σάλτσες, καυτερά, λάδια, σουβλάκια, πίτσες απαγορεύονται. Αν παρ' όλη τη θεραπεία και τη χορήγηση σωστής διαίτας οι εμετοί συνεχίζονται καλό είναι να προβείτε σε πλήρεις

Απάντηση κας Ζάνας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Τετάρτη, 09 Νοέμβριος 2016 14:23 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2016 11:02

εξετάσεις (υπέρηχο-γαστροσκόπηση). Ελπίζω να σας βοήθησα.

Κωνσταντάρας Γιάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ