

Απάντηση κας Ειρήνης

Συντάχθηκε απο τον/την Κοτζαμπασάκη Αργυρή

Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2017 17:18 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2017 19:01

Ερώτηση:

Γεια σας κ. Κοτζαμπασάκη. Έχω ένα θηλυκό σκυλάκι στερημένο 2,5 χρονών. Έχω δοκιμάσει αρκετά spot-on για τα εξωπαράσιτα. Κανένα δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους ψύλλους. Στη βόλτα την αφήνω να πηγαίνει στα χόρτα. Τι μπορώ να κάνω; Ευχαριστώ, Ειρήνη Κλάδου.

Απάντηση:

Θα πρέπει να δοκιμάσετε συνδυασμούς προϊόντων που να σας καλύπτουν τόσο από την εξωπαρασίτωση από ψύλλους και κρότωσης (τσιμπούρια) που μεταδίδουν λοιμώδη νοσήματα όπως ερλιχίωση, μπαμπεζίωση, κλπ που είναι ορατά και με γυμνό μάτι , όσο και από τα νύγματα σκνιπών-κουνουπιών που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΑ τόσο εύκολα (μεταδίδουν την Λεϊσμανίωση -Καλά -αζαρ) . Αναγκαίος λοιπόν είναι ο συνδυασμός :

1. Εντομοκτόνο-παρασιτοκτόνο σκεύασμα όπως χημικό -φαρμακευτικό περιλαίμιο μακράς δράσης που θα μένει σταθερά πάνω στο ζώο .

2. Εντομοκτόνο-παρασιτοκτόνο σκεύασμα όπως spot on ή χάπι με δράση μηνιαία ή τρίμηνη δράση .

Απάντηση κας Ειρήνης

Συντάχθηκε απο τον/την Κοτζαμπασάκη Αργυρή

Δευτέρα, 26 Ιούνιος 2017 17:18 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 28 Ιούνιος 2017 19:01

3.Εντομοαπωθητικό προϊόν όπως φυτικά σπρέυ με σιτρονέλλα, γερανιόλη, γλανδιόλη, ευκάλυπτο κλπ.

Σε κάθε περίπτωση ακολουθείτε πιστά τους χρόνους εφαρμογής των σκευασμάτων όπως αναγράφονται στην συσκευασία τους . Ο καταλληλότερος άνθρωπος για να σας υποδείξει τον κατάλληλο συνδυασμό όλων αυτών των προϊόντων και που μπορεί να εκτιμήσει το παρασιτικό φορτίο στην περιοχή που μένει και κινείται το ζώάκι σας είναι ο κτηνίατρος που το παρακολουθεί .