

Απάντηση κας Δήμητρας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Δευτέρα, 01 Οκτώβριος 2018 09:11 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 03 Οκτώβριος 2018 10:13

Ερώτηση:

Καλησπέρα σας, Το σκυλάκι μου είναι 9 χρονών και έχει μερική κρυφορχία, έχω κάνει κάποιες οικονομίες και θα ήθελα να προχωρήσω στην επέμβαση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω την κτηνιατρική σας γνώμη για τα εξής:- μπορεί να γίνει στείρωση και στον εξωτερικό όρχι ταυτόχρονα ή είναι καλύτερο η κάθε επέμβαση να γίνεται ξεχωριστά;- πριν την επέμβαση πέρα απο βιοχημικές εξετάσεις και ακτινογραφία θα προτείνετε κάτι άλλο;- η ακτινογραφία για να βρεθεί το σημείο του κρυπτόρχι απαιτεί νάρκωση ή μέθη;- αν όντως η μέθη και η γενική αναισθησία είναι κάτι διαφορετικό θεωρείτε κάποιο πιο κατάλληλο για την ηλικία του και το συγκεκριμένο είδος επέμβασης;- έχετε να μου προτείνετε κάτι άλλο να προσέξω; Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!!

Απάντηση

Κα Δήμητρα, βεβαίως και μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα. Μπορείτε να διαπιστώσετε -ίσως με μεγαλύτερη ακρίβεια και χωρίς καμιά ανάγκη για μέθη- την ακριβή θέση του όρχη με υπέρηχο. Η μέθη και η νάρκωση είναι δυο τελείως διαφορετικά πράγματα. Διαφέρουν προς την ένταση, το βάθος, την μη αίσθηση του πόνου και την δυνατότητα άμεσης αναιρέσης με αντίδοτο φάρμακο. Εφόσον οι βιοχημικές σας εξετάσεις είναι καλές και από καρδιοαναπνευστική άποψη είστε εντάξει μπορείτε να προχωρήσετε με ασφάλεια στο χειρουργείο. Ελπίζω όλα να πάνε καλά!

Κωνσταντάρας Γιάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ

Απάντηση κας Δήμητρας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Δευτέρα, 01 Οκτώβριος 2018 09:11 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 03 Οκτώβριος 2018 10:13
