

Απάντηση κας Δήμητρας

Συντάχθηκε απο τον/την admin

Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023 13:23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023 13:33

Ερώτηση:

Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα να παραθέσω μία ερώτηση καθώς βρίσκομαι στα όρια της απόγνωσης με την μικρή μου γατούλα. Είναι περίπου 6 ετών , την έχω από ημερών . Το φθινόπωρο κάναμε εξετάσεις για λοιμώδη νοσήματα λόγω ενός μπουκώματος που είχε εκδηλώσει και ανακαλύψαμε ότι έχει λοιμώδη περιτονίτιδα με δείκτη 1/200. Από τον Σεπτέμβριο έχουμε μπει σε μια σειρά θεραπειών με αντιβίωση και κορτιζόνη καθώς παρουσιάζει συνεχώς συμπτώματα ρινίτιδας με φτέρνισμα και μξούλες. Ο γιατρός μας είπε πως ενδέχεται η ρινίτιδα να οφείλεται στην λοιμώδη περιτονίτιδας . Επίσης μας χορήγησε ιντερφερόνη για 40 μέρες σε μορφή σιροπιού με διακοπή για 20 μέρες και έπειτα άλλες 40 μέρες θεραπεία την οποία διανύουμε αυτήν την περίοδο.

Το πρόβλημα μου είναι πως ενώ έχουμε κάνει πολλούς κύκλους αντιβίωσης και κορτιζόνης με εναλλαγή αντιβιοτικών το πρόβλημα της ρινίτιδας παραμένει σταθερό 5 μήνες μετά. Τελευταία φορά της έδωσα Ronaxan για 10 μέρες η οποία φάνηκε να την βοηθάει περισσότερο . Ωστόσο μετά από 10 μέρες εμφανίζει ξανά τα ίδια συμπτώματα . Ο γιατρός μου πρότεινε ακόμη έναν κύκλο αντιβίωσης Ronaxan για 10 μέρες σε συνδυασμό με κορτιζόνη των 5mg (μισό χάπι πρωί μισό βράδυ) για 7 μέρες . Η δοσολογία της κορτιζόνης μου φάνηκε λίγο παραπάνω και γι'αυτό θα ήθελα τη συμβουλή σας . Η γατούλα μου είναι ευδιάθετη τρώει κανονικά παίζει, κάνει νάζια, αλλά έχει αυτό το μόνιμο φτέρνισμα με τις υποκίτρινες μξούλες . Πώς θα με συμβουλευάτε να κινηθώ με τη θεραπεία ;

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας

Απάντηση:

Είναι τυπικό πρόβλημα σε γατούλες που έχουν προσβολή από ρινοτραχειίτιδα σε μικρή ηλικία. Είναι πάρα πολλά τα κατοικίδια που έχουν παρόμοιο χρόνιο πρόβλημα και χωρίς να έχουν ταυτόχρονη προσβολή από λοιμώδη περιτονίτιδα. Πρόκειται για μόνιμη βλάβη του βλεννογόνου που τον καθιστά ευπαθή σε αλλεπάλληλες προσβολές από κοινά μικρόβια.

Κι εγώ χρησιμοποιώ αντιβιώσεις με παράλληλη χρήση κορτιζόνης μέχρι τα 0.5mg/Kg βάρους.

Απάντηση κας Δήμητρας

Συντάχθηκε απο τον/την admin

Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023 13:23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 30 Ιανουάριος 2023 13:33

Καλό είναι οι αντιβιώσεις να αλλάζουν και να δίνονται τουλάχιστον για διάστημα 8-10 ημερών με τουλάχιστον δεκαήμερα διαστήματα ανάμεσά τους.

Δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις τα κατοικίδια -και οι ιδιοκτήτες- ζουν με το πρόβλημα...

Κωνσταντάρας Γιάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ