

Ερώτηση:

Γεια σας.

Έχω ένα κανισάκι έντεκα χρονών και τον Νοέμβριο που μας πέρασε, παρέλυσε ξαφνικά και είχε πάθει και αγκύλωση και πονούσε πολύ.

Είχε μαρμαρώσει, και φοβήθηκα πολύ ότι θα την έχανα.

Είχε αρχίσει με τρέμουλο και αστάθεια στα πίσω πόδια και ξαφνικά έπαθε αυτό το πράγμα.

Ο γιατρός της, της έκανε εξετάσεις συκώτι νεφρά και σάκχαρο, μου είπε ότι οι δείκτες στο συκώτι της ήταν λίγο ανεβασμένοι και είχε χαμηλό σάκχαρο, αλλά δεν ανησύχησε. Της έκανε ενέσεις με γενική αντιβίωση, δεξαμεθαζονη και νευρομπιόν, και επανήλθε τελείως, αλλά δεν μπόρεσε να ξαναγαβίσει.

Το ξαναέπαθε, μετά από κανά διμήνο, πιο ελαφρύ όμως αυτή την φορά.

Παρέλυσε μόνο το πίσω μισό της και της φεύγανε τσίσα-κακά.

Της ξαναέκανε εξετάσεις, της βρήκε τοξόπλασμα.

Έκανε την θεραπεία για το τοξόπλασμα και μετά της ξαναέδωσε την θεραπεία δεξαμεθαζονη και νευρομπιόν, χωρίς κάποια άλλη αντιβίωση, μόνο αυτή για το τοξόπλασμα πήρε και επανήλθε αρκετά η μικρή, αλλά όχι εντελώς. Η ουρίτσα της δεν έχει σηκωθεί ακόμη, αλλά έχει αρχίσει κάπως να την κουνάει και έχει αρχίσει να κρατάει λίγο τσίσα-κακά, αλλά δεν έχει φτιάξει εντελώς, ακόμη της φεύγουν.

Έχει μείνει στάσιμη σε αυτή την κατάσταση ένα μήνα και.

Τι κάνουμε τώρα;

Αλλάζουμε την δεξαμεθαζονη, συνεχίζουμε;

Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για την μικρή.

Ο γιατρός είπε ότι φοβάται για αλλοιώσεις αλλά δεν μου εξηγεί τι εννοεί, ούτε τι ακριβώς φοβάται.

Αυτό με ανησυχεί πιο πολύ.

Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

Απάντηση:

Απάντηση κας Ρένιας

Συντάχθηκε απο τον/την admin

Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023 11:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023 10:56

Κα Ρένια, τα αλληπάλληλα περιστατικά που εκδηλώνονται με πόνο στα πίσω άκρα, "αγκυλώσεις", μειωμένη κινητικότητα, απώλεια ελέγχου ούρησης και αφόδευσης

υποδηλώνουν
συνήθως
προβλήματα σπονδυλικής στήλης.

Αυτά μπορεί να είναι μετατοπίσεις σπονδύλων, προβολές (κήλες) μεσοσπονδυλίων δίσκων, οστεόφυτα στην έξοδο των νεύρων από τους σπονδύλους κοκ.

Η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι η ακινησία, η χορήγηση κορτιζόνης και σε βάθος χρόνου το αδυνάτισμα.

Η κορτιζόνη μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο διάστημα (πχ κι ένα μήνα) αρκεί να δίνεται ταυτόχρονα

και γαστροπροστασία.

Μετά τη μείωση του αρχικού πόνου μπορείτε να συνεχίσετε με αντιφλεγμονώδη (πάντα υπό ιατρική επίβλεψη).

Υπάρχουν νέας γενιάς αντιφλεγμονώδη που με μία χορήγηση σας καλύπτουν για μία εβδομάδα και είναι πολύ καλά ανεκτά.

Συνήθως, σε αυτά τα προβλήματα, η εξέλιξη που θα δείτε σε ένα μήνα από το συμβάν αντιπροσωπεύει

περίπου το 75-80% της συνολικής καλυτέρευσης.

Μετά το πέρας των έξι μηνών ότι έχει μείνει ως πρόβλημα, είναι μόνιμο.

Άλλη αντιμετώπιση είναι η χειρουργική όπου εντοπίζεται η εστία του προβλήματος και αντιμετωπίζεται χειρουργικά,

εάν αυτό είναι δυνατόν.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σπονδυλοδεσία, θυριδοποίηση ή καθαρισμό οστεοφύτων που πιέζουν νεύρα.

Όμως για τη χειρουργική αντιμετώπιση ο χρόνος μετράει εναντίον σας.

Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα.

Ελπίζω να σας κατατόπισα.

Απάντηση κας Ρένιας

Συντάχθηκε απο τον/την admin

Πέμπτη, 16 Μάρτιος 2023 11:55 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 29 Μάρτιος 2023 10:56

Εύχομαι καλή εξέλιξη για το σκυλάκι σας και καλό κουράγιο σε εσάς.

Κωνσταντάρας Ιωάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ